

عفونت گوش میانی

تهیه کننده : پریچه (رابط آموزشی)

تاریخ بازنگری : ۹۷/۹/۱۲

ویراست علمی : سوپروایزر آموزش سلامت

آموزشهای بعد از عمل:

۱. انجام سرفه ، عطسه و فین کردن با دهان باز
 ۲. پرهیز از تکان دادن سر تا 20 ساعت در صورت قرار دادن پروتز گوش
 ۳. قرار دادن گوش عمل شده به طرف بالا در هنگام خوابیدن
 ۴. بهبود کاهش شنوایی بعد از عمل ، پس از خارج شدن پانسمان و ترشحات داخل گوش
 ۵. رعایت نکات استریل در مورد گوش و پرهیز از وارد کردن اجسام نوک تیز
 ۶. مراجعه به پزشک در صورت تب ، خروج ترشح چرکی از گوش، درد گوش
- منبع : کتاب راهنمای بالینی پرستاری کودکان

شماره تماس بیمارستان علامه بهلول ۵۷۲۳۶۸۳۳

داخلی اطفال ۱۱۹۹


مددجوی گرامی شما می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی www.gmu.ac.ir و انتخاب مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی از منوی شبکه ها و مراکز درمانی و مراجعه به واحد آموزش سلامت به سایر مطالب آموزشی دسترسی پیدا کنید

مراقبت های پرستاری:

۱. توصیه به مصرف آنتی بیوتیک - اغلب آمپی سیلین و یا آموکسی سیلین - به صورت دقیق و در دوره کامل آن برای 14 تا 10 روز.
۲. استفاده از ضد درد و ضد تب و استفاده از قطرات گوش گرم شده برای افزایش آرامش کودک.
۳. در صورت عدم دریافت پاسخ دارویی یا وقوع عوارضی مثل ماستوئیدیت ، مننژیت و یا نا شنوایی پیشرونده انجام جراحی ضرورت پیدا می کند که شامل میرنیگوتومی - به منظور تخلیه ترشح از گوش میانی - و تمپانوستزی - به منظور کشیدن ترشحات از گوش میانی - می باشد.
۴. در حمام باید مراقب بود تا آب وارد گوش نشود و بعد از استحمام کودک نیز باید گوش را با پنبه استریل خشک کرد.
۵. استفاده از کیسه آب گرم در سمت گوش مبتلا و عدم وارد کردن اجسام نوک تیز داخل گوش
۶. رعایت رژیم نرم و مایعات برای جلوگیری از جویدن.

اوتیت میانی چیست؟

اوتیت میانی ، التهاب گوش میانی بوده و دومین بیماری شایع در شیرخواران و کودکان خردسال ، پس از عفونت سیستم تنفسی فوقانی است . اوج شیوع آن بین 6 ماهگی تا 6 سالگی است. شیوع آن در فصل پاییز و زمستان بیشتر است. عامل مستعد کننده این بیماری در کودکان، بیشتر به علت عریضی ، کوتاهی و مستقیم بودن لوله استاش می باشد . انسداد مکانیکی لوله استاش ، مانع کار طبیعی آن می شود و این انسداد می تواند به علت عفونت ، آلرژی ، آدنوئید و یا تومورهای بینی- حلقی باشد و به این ترتیب باعث احتباس ترشحات یا کشیده شدن ارگانیسرها از ناحیه بینی- حلقی به گوش میانی (به علت اختلاف فشار) گردد و می تواند منجر به ایجاد عفونت گوش میانی سرروزی ویا چرکی شود.



اوتیت میانی در دو نوع:

حاد : دقیقا در پشت پرده صماخ و اکثرا به دلیل باکتری استرپتوکوک پنومونیه ایجاد می گردد و درمان آن با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف (معمولا تزریقی) و یا عمل میرنگوتومی(عمل جراحی برای خارج کردن مایع از گوش میانی) می باشد.

مزمن : عفونت چرکی عود کننده یا ثابت گوش میانی بوده و اغلب با قدری کاهش شنوایی ، خروج ترشحات چرکی از گوش و درجاتی از سوراخ شدگی پرده صماخ همراه است و بیشتر به علت درمان ناکافی با آنتی بیوتیک ایجاد می شود. معمولا درمان پیشنهادی، عمل جراح تمپانوماستوئیدکتومی(ترمیم پرده و خارج کردن ترشحات پشت پرده) می باشد.

علائم اوتیت میانی:

در اوتیت حاد ، شیرخوار یا نوپا مرتب گوش مبتلا را می کشد ، سر را مرتب می چرخاند ، شبها از درد فریاد می کشد ولی در حالت نشسته آرام می شود .نوپایان ممکن است تحریک پذیر یا سست شوند و علائم عمومی بی اشتهایی، استفراغ و اسهال داشته باشند



مکیدن و جویدن باعث تشدید درد می شود و در معاینه تحذب یا درجاتی از پرفوراسیون پرده صماخ ، تب بیش از ۴۰ درجه ، عفونت حلقی ،التهاب غدد لنفاوی پشت گردن مشهود است. ولی در اوتیت مزمن ، درجاتی از ناشنوایی وجود دارد ولی درد ندارد.

عوارض شایع اوتیت میانی:

عارضه شایع اوتیت میانی ، التهاب بینی- حلقی و سایر عوارض شامل :ناشنوایی ، ماستوئیدیت ، عوارض چرکی درون جمجمه - مننژیت ، آبسه مغزی ، انسفالیت موضعی - و آسیب عصب صورت (پارالژی) می باشد .

