




Bohlool Hospital

## تزریق آواستین



بخش جراحی ۴ (گوش، حلق و بینی)

واحد آموزش سلامت—تاریخ بازنگری: آذر ۹۸

• قطره آنتی بیوتیک و کورتون تجویز شده را طبق نظر پزشکتان مصرف کنید.

• بعد از تزریق آواستین از مالیدن چشم های خود خودداری کنید و هنگام پاک کردن اشک ریزش به آرامی اطراف چشم های خود را پاک کنید

• تا روز بعد که به پزشکتان مراجعه میکنید، استحمام نکنید.

روز بعد از تزریق و سپس هر ۴ الی ۶ هفته بیمار معاینه می شود و در صورت صلاحدید تزریق مجدد تکرار می شود بعد از تزریق بیمار عوارضی مانند اشک ریزش، قرمزی چشم و سوزش چشم را تجربه می کند.

اما در صورت بروز علائمی مانند درد شدید، تهوع، دیدن سایه در میدان بینایی در اسرع وقت به چشم پزشک مراجعه کنید.

برای معاینات بعدی حتما مجددا در زمان معین به پزشک مراجعه شود.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات :

۰۵۱-۵۷۲۳۶۸۳۵

داخلی ۱۱۵۵

دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی:

[WWW.BOHLLOOL.GMU.AC.IR](http://WWW.BOHLLOOL.GMU.AC.IR)

آموزش سلامت

**آرامش، سلامت و رفاییت شما عزیزان بالاترین هدف ماست.**

**ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمائید.**



## مراقبت های بعد از تزریق آواستین

♦ دو ساعت بعد از تزریق، پانسمان چشم باز شود و بلافاصله ریختن قطره شروع گردیده و هر ۴ ساعت یک قطره (فقط در زمان بیداری) تا ۵ روز بعد ادامه یابد.

♦ بعد از تزریق در صورت درد میتوان از داروهای ضد درد مانند استامینوفون یا ژلوفن و ... استفاده نمود.

♦ در صورت افزایش درد، قرمزی جدید چشم و یا کاهش بینایی (نسبت به قبل از تزریق) فوراً به نزدیک ترین متخصص چشم و یا اورژانس مراجعه نمایید.

♦ ۶ ساعت بعد از تزریق بیمار میتواند شستشوی صورت انجام دهد و منعی جهت وضو گرفتن و استحمام وجود ندارد. ولی حتی الامکان از ورود آب به داخل چشم جلوگیری شود.

♦ اثر داروی تزریق شده بلافاصله ظاهر نمی شود؛ بنابراین در صورت عدم افزایش بینایی بلافاصله بعد از تزریق، نیاز به مراجعه نمی باشد.

♦ محدودیت غذایی و فعالیتی خاصی وجود ندارد.

♦ نیازی به قطع آسپرین و یا سایر داروها، قبل و بعد از تزریق نمی باشد.

## عوارض تزریق آواستین چیست؟

خوشبختانه بیمار با تزریق آواستین با عوارض خاصی مواجه نخواهد شد. برخی از عوارض مانند درد جزئی در ناحیه تزریق، حالت تهوع، سردرد خفیف، ریزش اشک، قرمزی چشم، ایجاد خونریزی یا پارگی در شبکیه که به ندرت اتفاق می افتد می تواند مشاهده شود.



در اکثر موارد عارضه قابل توجهی پیش نخواهد آمد.

افرادی که به بیماری های چشمی دچار هستند و پزشک تشخیص داده است که نیازمند تزریق آواستین می باشند باید حتما طی مراجعات منظم تزریق را انجام دهند تا چشم بیش از این درگیر نشود چرا که به راحتی کم شدن دید و در نهایت کوری حاصل خواهد شد.

در این بین بیماران دیابتی باید اهمیت بیشتری به سلامت چشم خود دهند زیرا بیش از سایر بیماران در معرض خطر قرار دارند.

## نحوه تزریق آواستین چگونه است؟

برای تزریق آواستین بیمار به اتاق عمل برده شده و پزشک متخصص چشم بدون انجام بیهوشی و تنها با ایجاد بی حسی عملیات مربوطه را به انجام خواهد رساند در نتیجه یک عمل سرپایی و سریع خواهد بود که انتظار می رود فرد طی مدت کوتاهی به فعالیت های روزانه خود بازگردد و دوران نقاهت بلنمدتی را سپری نکند.

این تزریق توسط یک سر سوزن بسیار نازک و ظریف صورت می گیرد و با توجه به تشخیص پزشک می تواند طی یک مرحله برای هر دو چشم بیمار و یا با ایجاد چند روز فاصله بین تزریق دو چشم برای چشم دیگر انجام شود.

پس از اتمام کار چشم یکی دوساعت پانسمان می شود.



آواستین یکی از دارو هایی که به شکل تزریق داخل چشمی در چند سال اخیر استفاده می شود. این دارو به چشم تزریق می شود تا به کاهش افت دید در این بیمار کمک کند. در درمان بسیاری از بیماری های چشم مانند رتینوپاتی دیابتی ، انسداد وریدهای شبکیه ، ایجاد عروق خونی نا به جا در مشیمیه و بسیاری دیگر از بیماری های شبکیه کاربرد دارد.

بسیاری از بیماریهای ذکر شده مزمن و طولانی مدت هستند ، به همین دلیل دوره درمان آنها نیز طولانی است و در این مدت باید بطور متناوب هر چند وقت یکبار تزریق داخل چشم تکرار شود ، همچنین بیماران نباید از این بابت نگرانی داشته باشند

رتینوپاتی دیابتی عارضه چشمی ناشی از دیابت است که به دلیل تغییرات ایجاد شده در رگ های خونی رخ می دهد و می تواند باعث تخریب شبکیه شده و در نتیجه تصویری که شبکیه به مغز میفرستد را تار کند.

آمپول آواستین از ایجاد عروق جدید که در شبکیه چشم افراد دیابتی صورت می گیرد ، جلوگیری می کند . آواستین پس از رقیق شدن توسط دکتر داروساز، توسط جراح چشم پزشک در اتاق عمل و در شرایط خاصی در چشم بیمار تزریق می شود.

