



سپسیس نوزادی

تهیه کننده: بهاره نیک رفتار
 ویراست علمی
 سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر آموزش سلامت
 تاریخ بازنگری: ۹۷/۱۰/۳



کنترل نوزاد عفونی:

به محض شک به عفونت در نوزاد باید بستری و درمان با آنتی بیوتیک شروع شود زیرا به تاخیر انداختن در شروع درمان می تواند عواقب جبران ناپذیری در نوزاد به جای گذارد.

نوزاد مبتلا به سپسیس ۱۰ تا ۱۴ روز حداقل در بیمارستان بستری می شود. اگر مننژیت هم به دنبال سپسیس نوزاد را درگیر کرده باشد، درمان ممکن است تا ۲۱ روز ادامه پیدا کند.

مادر گرمی

لطفا در دوره بستری بودن نوزاد خود مرتب دستهای خود را بشویید تا از انتقال عفونت جلوگیری شود.

منبع: پرستاری NICU واحد مراقبتهای ویژه نوزادان

ارتباط با ما و پاسخگویی به سؤالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۲

داخلی: ۱۱۶۳



روش های تشخیصی

- آزمایشات خون و تهیه کشت خون
- کشیدن مایع مغزی - نخاعی
- جمع آوری ادرار و کشت ادرار
- گرفتن عکس از ریه نوزاد تا از نظر عفونت ریه بررسی شود





علائم عفونت خون

- نشانه های تنفسی : تنفس تند، تو رفتگی قفسه سینه و در موارد شدید قطع تنفس
- ناپایداری درجه حرارت : کاهش یا افزایش دمای بدن نسبت به دمای طبیعی
- نشانه های گوارشی : عدم تحمل تغذیه و شیر، نفخ شکم
- نشانه های عصبی : خواب آلودگی و بی حالی ، عضلات شل ، در بعضی موارد لرز و حتی تشنج دیده می شود.
- تغییر ضربان قلب که خیلی بیشتر از حد طبیعی و یا خیلی کندتر از حد طبیعی است.
- تغییر رنگ پوست : پوست رنگ پریده یا کبود یا زردی پوست



عفونت نوزادی به اشکال زیرنمایان می شود:

- عفونت زودرس : از بدو تولد تا روز هشتم تولد بروز می کند که بیشتر نوزادان نارس مبتلا می شوند.
- عفونت دیررس : از روز هشتم تولد تا ۲۸ روزه گی که معمولا در نوزادان سر موعد دیده می شود.
- عفونت بیمارستانی : در نوزادان نارس بستری در بخش میزان ابتلا بیشتر می باشد.

عواملی زمینه ساز عفونت بیمارستانی :

- ۱- بستری طولانی مدت در بیمارستان
- ۲- تزریقات داخل رگ به مدت طولانی
- ۳- تجهیزات آلوده بیمارستانی



عفونت خونی (سپسیس نوزادی) چیست؟

یک بیماری جدی به حساب می آید که سیستم دفاعی بدن نوزاد توسط مواد سمی که از باکتری ها ، ویروس ها و... آزاد می شود مورد تهاجم و حمله قرار می گیرد.



علل عفونت خونی در نوزاد چیست؟

- عفونت های مادر در طی بارداری
- عفونت رحمی یا جفتی
- زایمان زودرس
- پارگی زودرس کیسه آب که بیش از ۲۴ ساعت طول کشیده باشد
- زایمان طولانی و مشکل