



پیام آموزشی شماره (۲۳)

تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو: CCHF (Crimean Congo hemorrhagic fever):

یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد که توسط کنه منتقل می شود.

علائم: تب ناگهانی، درد عضلات، ترس از نور، تهوع استفراغ، خونریزی از مخاط ها، خط زیر بغل، محل های تزریق و پتشی و..

روش های انتقال: گزش کنه، نیش حشرات، تماس مستقیم با لاشه دام، تماس مستقیم با خون، ترشحات بیمار

تشخیص: ارسال نمونه خون در سه نوبت ۰، ۵ و ۱۰ روز به آزمایشگاه مرکزی استان

درمان: اصلاح اختلال آب و الکترولیت و درمان ضد ویروسی ریباویرین

نکات مراقبتی: بیمار نباید جابجا شود. فشارخون بیمار با دستگاه دیجیتالی اندازه گیری شود.

*وسایل حفاظتی شامل کلاه، عینک، دو جفت دستکش، گان، روپوش ضد آب وچکمه برای همه پرسنل و ملاقات کنندگان ضروری است.

*بیمار در اتاق ایزوله بستری شود با رعایت کلیه احتیاطات لازم.

توجه: پرسنل در تماس با بیمار، تا ۱۴ روز پس از تماس هر روز درجه حرارت خود را چک کنند و در صورت علائم بالینی درمان شروع شود.

در صورت نیدل استیک شدن با بیمار، درمان با ریباویرین تا ۵ روز برای فرد تماس یافته شروع می شود. در صورت فوت بیمار مطابق دستورالعمل کشوری عمل شود.

آموزش پس از ترخیص: عدم بارداری تا ۶ ماه هم خانم و هم آقا-ریزش مو بعد از ۵ ماه برطرف می شود- دردهای عضلانی و ضعف و بی حالی تا یک سال ممکن

است ادامه داشته باشد.