



پیام آموزشی شماره (۹)

ویال های مولتیپل دوز

ویال های حاوی دارو که به علت داشتن مواد نگهدارنده با رعایت شرایط آسپتیک می توانند بیشتر از یک بار استفاده شوند مانند ویال انسولین یا پتاسم کلراید.

هنگام استفاده از این ویال ها به این نکات دقت کنید:

- * تاریخ باز شدن ویال روی آن حتما قید گردد و تاریخ انقضاء بر حسب کارخانه سازنده در نظر گرفته شود.
- * قبل از کشیدن دارو پوشش پلاستیکی روی ویال با الکل تمیز و خشک گردد.
- * در هر بار استفاده از ویال از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده شود.
- * **سرسوزن به هیچ وجه نباید روی پوشش پلاستیکی باقی بماند** چون راه مستقیم ورود میکروب است.
- * از یک سرنگ برای کشیدن محلول فقط یک بار استفاده کنید. تعویض سرسوزن نیز صحیح نیست.
- * بیشتر ویالها بعد از باز شدن در یخچال نگهداری شود.
- * **ویال لیدوکائین بعد از باز شدن در یخچال نگهداری نشود** چون امکان رشد ارگانیزم های استافیلوکوک اورئوس فراهم می شود.
- * استفاده از ویال های واکسن پس از ۴ هفته از باز شدن، ممنوع است.
- * باتل های سرم نباید به عنوان منبع مشترک برای رقیق کردن دارو برای بیش از یک بیمار استفاده شوند.
- * **انسولین های قلمی (لانتوس و..)** پس از باز شدن در یخچال نگهداری نشود و تا ۴ هفته در دمای اتاق (کمتر از ۲۵ درجه قابل نگهداری است).