



Bohlool Hospital

## راهنمای داروهای مصرفی بیماران

### در کووید ۱۹



آموزش سلامت

بیمارستان علامه بهلول گنابادی

تدوین: بهار ۹۹

داروها را دقیقاً مطابق دستور پزشک معالج خود مصرف نمایید و سایر نکات بهداشتی و مراقبتی را نیز رعایت نمایید.

در صورت داشتن بیماری زمینه ای و مصرف داروهای دیگر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.



تا زمانی که تحت درمان با داروهای کووید ۱۹ هستید از مصرف گریپ فروت خودداری کنید.



منبع :

مطالب آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری

سازمان بهداشت جهانی

Kaletra

## (لوپیناویر + ریتوناویر)

هرگز مصرف دارو را فراموش نکنید.

دارو را با غذا مصرف کنید و در صورت عدم دسترسی به غذا می توانید دارو را با معده خالی مصرف کنید.

از شکستن و یا خرد کردن قرص اجتناب کنید و قرص را به صورت کامل با یک لیوان آب مصرف کنید.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص هر موقع که به یاد آوردید دارو را مصرف کنید، ولی اگر کمتر از دو ساعت تا مصرف قرص بعدی زمان باقی است از مصرف قرص فراموش شده خودداری کنید.

درمان کووید ۱۹ علامتی است و آنتی بیوتیک‌ها در درمان بیماری با منشأ ویروسی کاربردی ندارند.

لذا از مصرف خودسرانه هر داروی دیگری جداً خودداری نمایید.



هموطن گرامی؛ سلام:

این برگه آموزشی دربردارنده نکاتی در مورد داروهای مصرفی در منزل است.

### لطفاً این مطالب را به دقت مطالعه بفرمایید

خوشحالیم که توانستید بیماری کرونا (کووید ۱۹) را شکست دهید و به سلامت از بیمارستان مرخص شوید.

باید به شما یادآور شویم که درمان شما هنوز کامل نشده و همچنان نیاز به مراقبت دارید.

ممکن است بر حسب شرایط، یک یا همه موارد داروهای ذکر شده برای شما تجویز شده باشد.

لطفاً هنگام مصرف داروها به نکات ذکر شده در این پمفلت توجه فرمایید.

بیمار عزیز، از قطع خودسرانه دارو حتی در صورتی که احساس بهبودی می کنید، خودداری نمایید.



۱

### اسلتامیویر (نامی فلو)

بهتر است دارو با غذا مصرف شود. ولی درشرایطی که به غذا دسترسی ندارید، می توانید دارو را با معده خالی نیز مصرف کنید.

حتماً سر ساعت دارو را مصرف کنید و در صورتی که فکر می کنید ممکن است فراموش کنید، ساعت کوک کنید.

در صورتی که نمی توانید کپسول را قورت دهید می توانید محتویات آن را در یک شربت حل کنید و میل کنید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید هنگام به یادآوردن، سریع آن را مصرف کنید ولی اگر کمتر از دو ساعت به زمان مصرف قرص بعدی زمان دارید دیگر مصرف **نکنید** و هنگام رسیدن زمان مصرف از خوردن دو کپسول با هم **اجتناب کنید**.

در صورت مصرف داروهای دیگر حتماً اسامی والگویی مصرف دارو ها را با پزشک خود در میان بگذارید.



۲

### هیدروکسی کلروکین

دارو را به موقع و سر ساعت مصرف کنید.

به فاصله چهار ساعت قبل و بعد از مصرف دارو از مصرف ترکیبات آنتی اسید مثل شربت و قرص و شربت آلومینیوم ام جی اس و شربت منیزیوم هیدروکسید خودداری کنید.

در صورتی که داروهای دیگر مصرف می کنید، پزشک خود را از مصرف آنها مطلع کنید.



بیمار عزیز، از مصرف داروها بدون نسخه پزشک **خودداری** نمایید.



۳