

عوارض احتمالی بیهوشی و بیحسی چیست؟

عمل جراحی دردناک است و این درد را باید به طریقی از بین برد. آنستزی با کم کردن درد بیمار در حین جراحی کمک زیادی به پیشرفت طب کرده و موجب شده است تا بتوانیم اعمال جراحی را به راحتی انجام بدهیم. با این حال آنستزی ممکن است با مشکلاتی برای بیمار همراه باشد. این عوارض ممکن است تا چند ساعت و یا چند روز بعد از بیهوشی و یا بیحسی منطقه ای باقی بمانند و در اکثریت قریب به اتفاق بیماران با مراقبت های پزشکی از بین میروند.

تعدادی از این مشکلات عبارتند از:

حالت تهوع و استفراغ: این مشکل هم در بیهوشی و هم در بیحسی رژیونال وجود دارد.

گلودرد: در مواردی است که بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته و به علت لوله ای است که در حین بیهوشی در درون نای بیمار قرار داده میشود. این درد ممکن است چند ساعت تا چند روز باقی بماند.

احساس گیجی: به علت کاهش فشار خون و یا داروهای مورد استفاده ایجاد میشود. این مشکل هم در بیهوشی و هم در بیحسی رژیونال وجود دارد.

لرز: به علت داروهای بیهوشی یا به علت سرد ماندن بیمار در حین جراحی است. درمان آن با گرم کردن بیمار با حوله برقی است. این مشکل هم در بیهوشی و هم در بیحسی رژیونال وجود دارد.

سردرد: داروهای مصرف شده در حین جراحی، کاهش فشار خون، اضطراب و دیگر علل میتوانند موجب سردرد شوند. سردرد شدید بعد از بیحسی اسپینال و اپیدورال بیشتر دیده میشود. این مشکل هم در بیهوشی و هم در بیحسی رژیونال وجود دارد.

خارش: به علت مصرف ضد درد های مخدر به مقدار زیاد و یا به علت حساسیت به داروها ایجاد میشود. این مشکل هم در بیهوشی و هم در بیحسی رژیونال وجود دارد.

کمر درد: معمولاً به علت دراز کشیدن به مدت طولانی بر روی تخت جراحی ایجاد میشود. این مشکل هم در بیهوشی و هم در بیحسی رژیونال وجود دارد.

گیجی و اختلال حافظه: بیشتر در افراد مسن و بعد از بیهوشی عمومی دیده میشود.

عفونت ریه: بیشتر در افراد سیگاری دیده میشود. در بیحسی رژیونال دیده نمیشود.

اختلال ادراک: در مردان بیشتر بصورت عدم توانایی در ادرار کردن و در زنان بصورت بی اختیار است. معمولاً تا چند ساعت بعد از جراحی خوب میشود. در بیحسی رژیونال دیده میشود.

عوارض کمتر شایع آنستزی عبارتند از:

سخت نفس کشیدن و کندی تنفس: بر اثر استفاده زیاد از داروهای مخدر برای کاهش درد بعد از عمل ایجاد میشود.

آسیب به دندان، لب و زبان: این آسیب ها معمولاً خفیف بوده و بصورت خونریزی های کوچک هستند و به علت فشار لوله تنفسی است که در حین بیهوشی عمومی برای بیمار استفاده میشود.

کاملاً بیهوش نشدن و آگاهی از اطراف در حین بیهوشی عمومی: این وضعیت در بعضی موارد ایجاد شده و با اینکه بیمار درد ندارد ولی در حین بیهوشی کاملاً به خواب نرفته و از اتفاقاتی که در اثناء عمل میفتد آگاه است.