




پست الالکترونیکی شماره ۸۰

■ اقدامات برای موظفیت مادران شاغل در تداوم شیردهی ■ حمایت مادران شاغل برای تغذیه با شیر مادر و پرورش کودک



تغذیه با شیر مادر

iec.behdasht.gov.ir



■ اقدامات برای موفقیت مادران شاغل در تداوم شیردهی

مادران استحقاق دارند:

اطلاعات اساسی و صحیح را به موقع دریافت کنند، مورد تشویق و دلگرمی قرار گیرند، مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های عملی به آن‌ها رائیه شود، دسترسی به مشاوره برای پیشگیری و حل بموقع مشکلات شیردهی داشته باشند و با همدی به صحبت‌های شان گوش دهند.



نیاز مادر به حمایت:

مادران برای موفقیت در امر شیردهی به حمایت همه جانبه از سوی خانواده، دولت، کارکنان بهداشتی درمانی، دولت و قوانین، و حمایت در محیط کار و جامعه و سیستم بهداشتی نیاز دارند تا بتوانند بر چالش‌های موجود شامل اطلاعات نادرست و تبلیغات تغذیه مصنوعی شیرخواران، تردیدها درباره توانایی شیردهی خود، ایجاد توازن بین شیردهی و اشتغال در خارج از منزل، شرایط اضطراری و بحران‌ها... غلبه کنند. حمایتی که مادر نیاز دارد می‌تواند از یک حمایت رسمی مثل مراقبت در یک مرکز بهداشتی درمانی تا حمایتی مثل یک لب‌خند اطمینان بخش از سوی مادر دیگری باشد. حمایت‌های لازم از منابع مختلف حرفة ای و مردمی باید تأمین شود.



شواهد مؤثر بودن حمایت از مادران:

مرور مطالعات انجام شده در مورد بررسی اثرات حمایت از مادر بر طول مدت تغذیه با شیر مادر (اعم از تغذیه انحصاری یا نسبی) و تغذیه انحصاری به تنها یی، نشان داده که تمام شیوه‌های مختلف حمایت از مادران اعم از حرفه‌ای و مردمی در مجموع، طول مدت تغذیه باشیر مادر را افزایش داده و نشانگر اثرات مفید و قابل توجه بر تغذیه شیرخواران باشیر مادر به هر روش با بیشترین تاثیر بر تغذیه انحصاری باشیر مادر است.

در ارتباط با تاثیر روش‌های بیمارستانی بر افزایش میزان تغذیه انحصاری باشیر مادر، مشاوره و ارائه بسته‌هایی در حمایت از تغذیه باشیر مادر هنگام ترجیحی، آموزش کارکنان بیمارستان در مدیریت شیردهی و ملاقات در منزل نیز بسیار موثر بوده است.



ضرورت حمایت و ترویج تغذیه باشیرمادر:

تغذیه باشیرمادر بهترین شروع زندگی را برای نوزادان در تمام مناطق مختلف جهان از نظر توسعه یافتنگی فراهم می‌کند. حتی در کشورهای توسعه یافته، عدم تغذیه باشیرمادر با افزایش خطر بقا، و سلامت کودکان مرتبط است. تغذیه مصنوعی با میزان بالاتر مرگ نوزادان همراه است. شروع اولیه و بموضع تغذیه انحصاری باشیرمادر می‌تواند جان بیش از یک میلیون نوزاد را حفظ نماید. کودکانی که باشیرمادر تغذیه می‌شوند، از سلامت و تکامل طبیعی برخوردار شده، میزان های مرگ و میر در آنها کمتر و ضریب هوشی آنها بالاتر است. اثرات مطلوب تغذیه باشیرمادر در دوران بزرگسالی نیز در ابتلا کمتر به بیماری های مزمن ثابت شده است.

مادران و جامعه نیز از تغذیه شیرخواران باشیرمادر سود می‌برند. سلطان پستان در زنان شیرده و زنانی که به مدت طولانی تری شیر داده اند، کمتر است. شیردهی در تاخیر قاعده‌گی و مدیریت بارداری سالم و مشکلات کمتر سلامت مادران و کودکان موثر است. تغذیه انحصاری باشیرمادر منجر به کاهش هزینه های اقتصادی برای خانواده، جامعه، سیستم بهداشتی و محیط زیست می‌گردد.

حمایت همه جانبی :



انواع حمایت های مورد نیاز مادران برای شیردهی را با استفاده از ۵ حلقه نشان می‌دهند. این حلقه ها تاثیرات بالقوه عوامل مختلف را بر تصمیم مادر برای تغذیه باشیرمادر و داشتن تجربه مثبت شیردهی تشریح می‌نمایند. حلقه های حمایتی عبارتند از:

خانواده و شبکه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، محیط کار و اشتغال، دولت و قوانین، مقابله با بحران ها، همه زنان را که در دایره مرکزی قرار می‌گیرند، احاطه می‌کنند.





زنان در حلقة مرکزی:

زنان نه فقط حمایت را از منابع مختلف دریافت می‌کنند، بلکه خود فعالانه حمایت را فراهم می‌کنند. زنان نقش کلیدی در تمام حلقه‌ها دارند. حمایت قوی در حلقه‌های بیرونی، قدرت قوی تری در حلقة مرکزی ایجاد می‌کنند که پرتوی آن به سایر حلقه‌های حمایتی نیز می‌رسد. نقش زنان بطور قابل ملاحظه ای وسیع ترو عمومی تراز خانه و خانواده است. تقویت این نقش‌های گسترش یافته نیاز به شبکه دارد. شبکه‌های قوی از سازمان‌های حمایت مادر از مادر در سراسر دنیا بوسیله زنان ایجاد شده و نقش حیاتی در این مقوله دارند.

خانواده و شبکه اجتماعی:

تمام زنان با افراد خانواده، دوستان و همسایگان خود ارتباط و برخورد متقابل دارند و ارتباطات دیگری نیز در جامعه با دیگران برقرار می‌کنند. خانواده و شبکه اجتماعی برای زنان بر حسب فرهنگ، محل زندگی، سطح اجتماعی اقتصادی و فعالیت‌های آنان متفاوت است. خانواده حمایت خود را بالا فاصله از مادر فراهم نموده و به این شبکه حمایتی ادامه می‌دهد که بوسیله پدرکودک شروع می‌شود و شامل سایر نزدیکان و منسوبین می‌گردد. پدران نقش مستقیمی در حمایت از تغذیه با شیر مادر در خانواده و فضاهای عمومی دارند.

حمایت از مادر فراتر از حمایت خانواده، شامل دوستان مادر، همسایگان و کسانی که مادر را در جامعه ملاقات می‌کنند گسترش می‌یابد. اگر جامعه به تغذیه با شیر مادر بعنوان یک فعالیت طبیعی نگاه نکند، قادر شدن مادر به شیردهی در چنین موقعیت‌هایی ممکن است با مشکل روبرو شود. حمایت از تغذیه با شیر مادر شامل کمک و تشویق مادر و کودک است که در هر مکان و موقعیتی تاحده ممکن با هم باشند. نقش رهبران مذهبی در جلب حمایت از مادران حائز اهمیت است.

زنان همچنین تحت تاثیر مثبت یا منفی مطالبی هستند که می‌خواند، و یا از طریق رسانه‌های

گروهی می بینند و می شنوند و در دسترس شان قرار می دهند. یک شبکه اجتماعی قوی بوسیله فراهم کردن حمایت های مورد نیاز می تواند به حذف اثرات منفی بر مادران کمک کند. بعلاوه گروه های حمایت مادران در جهان گسترش یافته و به شیوه های مختلف در مکان های مختلف فعالیت می کنند. در این گروه ها مادران در کنار یکدیگر قرار می گیرند و تجربیات شان را به اشتراک می گذارند و در یافتن راه حل برای مشکلات شان به یکدیگر کمک می کنند.

مراقبت های بهداشتی



سیستم مراقبت بهداشتی و کارکنان آن تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تغذیه با شیرمادر دارند. این سیستم تمام کارکنان بهداشتی، کلینیک ها، پزشکان و خدمات بستری و سریابی بیمارستان و خدمات تغذیه ای برای مادران و شیرخواران را پس از ترجیح پوشش می دهد. کارکنان بهداشتی افراد محترم و الگویی برای مادران در جامعه هستند بنابراین آنچه که آنان در محل کار و در جامعه می گویند و انجام می دهند، می تواند بر رفتارهای بهداشتی مادران اثر را شته باشد. ترویج تغذیه مطلوب شیرخواران در طول هر مرحله از باروری و تولد برای موفقیت و قادر ساختن زنان به شیردهی اساسی است.

بیمارستان های دوستدار کودک حامی و مروج تغذیه با شیرمادر هستند. یک بیمارستان دوستدار کودک "ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر" را اجرا می کند و همچنین از پذیرش نمونه های شیر مصنوعی رایگان یا با تخفیف یا هرگونه اقلام تبلیغاتی برای این محصولات، با پیروی از کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر خودداری می کنند. تمام کارکنان در مورد تغذیه با شیر مادر آموزش می بینند و عملکرد بیمارستان برای اطمینان از اجرای ده اقدام ارزیابی می شود. در این بیمارستانها همه مادران و نوزادان قبل، حین و پس از تولد، و همچنین شیرخواران زیر ۲ سال بسترهای حمایت می شوند تا بهترین شانس را برای تغذیه با شیر مادر داشته باشند. دهمین اقدام بیمارستان های دوستدار کودک نیز شامل سیستم های حمایتی وسیع اجتماعی برای مادران است. میزان تغذیه با شیر مادر در بین شیرخواران متولد شده در بیمارستان های دوستدار کودک نسبت به متولیدین در سایر بیمارستان های بیشتر است. علاوه بر بیمارستان های دوستدار کودک، لازم است کمک های عملی و ماهرانه توسط تمامی کارکنان بهداشتی درمانی که با مادر کودک در تماس هستند در اختیار آنان قرار گیرد.

مادرانی که در بیمارستان دوستدار کودک زایمان می کنند با احتمال بیشتری تغذیه با شیر مادر را شروع می کنند، اما اگر بخواهند تغذیه انحصاری با شیر مادر را برای ۶ ماه ادامه دهند، برای این تداوم، نیاز به حمایت از سوی افرادی مانند ماماهای، کارکنان بهداشتی، مشاورین شیردهی و مشاورین مردمی آموزش دیده دارند. در مواردی که مادران از سوی یک فرد آموزش

دیده، حداقل ۷ بار ملاقات، حمایت و مشاوره می‌شوند، میزان تغذیه انحصاری با شیرمادر بالاتر است. حمایت از تمام مادران لازم است تا اطمینان حاصل شود که تغذیه با شیرمادر به خوبی پیش می‌رود. نباید منتظر بروز مشکل برای ارائه حمایت شد.



دولت و قوانین



سیاست‌های دولت و قوانین برای حمایت زنان در بسیاری از جوانب زندگی مادران از جمله شیردهی ضروری است. وقتی که بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر و قطعنامه های مرتبط با آن و قوانین ملی از جمله قانون ترویج تغذیه با شیرمادر اجرا شود، امکان شیردهی مادران شاغل تسهیل می‌شود و ضمناً مادران در برابر تاثیر سوء آگهی های تجاری تغذیه مصنوعی که تغذیه با شیرمادر را تضعیف می‌کنند، حفاظت می‌شوند.

در مورد کد بین المللی لازم به ذکر است که نگرانی های عمدۀ در مورد آثار مخرب تغذیه مصنوعی و تبلیغ وسیع جانشین شونده های شیر مادر بوسیله شرکت های سازنده و کاهش انگیزه عمومی برای تغذیه با شیر مادر، زنگ خطری بود که منجر به تصویب کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر در سال ۱۹۸۱ گردید. هدف کد، حفظ و ترویج تغذیه با شیر مادر و فراهم نمودن تغذیه سالم و ایمن برای شیرخواران از طریق تنظیم بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر است. قطعنامه های بعدی مجمع بهداشت جهانی که در جهت شفاف سازی و تقویت کد صادر شده اند، با همان اهمیت باید اجرا شوند. یک مشکل عمدۀ که فقدان انگیزه و مهارت حمایت از مادران برای شیردهی را دامن می‌زند، رقابت سرمایه‌گذاری بازاریابی های وسیع جانشین شونده های شیر مادر و دیگر محصولات شرکت ها است. شعار هوشمندانه، تصاویر قابل توجه، دادن نمونه های رایگان و انواع هدایای جذاب استفاده می‌شود تا مادران، کارکنان بهداشتی درمانی و سایر پرسنل را متقدّع سازند که تغذیه با بطّری به خوبی تغذیه از پستان مادر است. استراتژی جهانی بر ضرورت محدود کردن شرکت های سازنده شیرمصنوعی از بازاریابی وسیع و ترویج محصولات شان از طریق

پذیرش کد و اجرای آن تاکید دارند. اما برای نتیجه بخش بودن آن لازم است هر کشوری که را به صورت قانون ملی خود اجرا نماید که در کشور ما قانون ترویج تغذیه با شیرمادر در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در سال ۱۳۸۶ نیز تکمیل گردیده است. قانون شامل مرخصی زایمان برای تغذیه انحصاری با شیرمادر، امکان استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی در طول ساعات کار پس از بازگشت مادر به کار، حفظ امنیت شغلی و استفاده از مهدکودک و ممنوعیت تبلیغات تغذیه مصنوعی است.

محیط کار و اشتغال



«هر مادری شاغل محسوب می‌شود.» این شعار به واقعیت زندگی مادران اشاره دارد. مادر بودن به معنی مسئول بودن برای مراقبت و تأمین رفاه کودکان است. این مسئولیت نیاز به صرف وقت، انرژی و توجه دارد. تغذیه انحصاری شیرخواران زیر ۶ ماه با شیرمادر بطور متوسط نیاز به ۱۱ بار تغذیه در هر ۲۴ ساعت در شب و روز دارد. برای مادران کاهش موقت فشار کار در خانه و محل کار سودمند است، چون وقت و انرژی لازم را برای شیردادن به دست می‌آورند. ایجاد محیط‌های کار دوستدار مادر و کودک و سیاست‌های حفاظت از مادران که فراهم کننده حفاظت کار، مرخصی پس از زایمان و مرخصی ساعتی شیردهی با پرداخت حقوق، نگهداری شیرخواران در داخل یا نزدیک محل کار مادران، حفاظت از تعییض و جدول کاری قابل تغییر با کار نیمه وقت برای والدین، چارچوب حمایتی لازم را فراهم می‌کنند. جلب همکاری اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های غیردولتی برای گسترش دامنه حمایت از مادران به سایر بخش‌هایی که زنان در آنها اشتغال دارند (مثل بخش خصوصی، کارگران مهاجر، کارگران کشاورزی و غیره) ضروری است.

۳ رکن حمایت از زنان شیرده در محل کار عبارتنداز :

- تخصیص زمان برای تغذیه طفل با شیرمادر یا دوشیدن شیر
- اختصاص مکانی تمیز و خلوت و بدون استرس برای امر فوق
- نگرش عمومی مثبت و اولویت دادن به تغذیه با شیرمادر



مقابله با بحران‌ها

وقتی که مادر به خاطر عوامل خارج از کنترل خود در شرایط استرس قرار می‌گیرد، مسئولیت‌های وی در قبال فرزندش برای تأمین تغذیه و حفظ بقاء او افزایش می‌یابد. مادر ممکن است نیاز به یافتن مکان امن، غذا و لباس داشته باشد و برای برقراری ارتباط با سایر افراد خانواده اش، سازمانهای حمایتی، شبکه و مراجع قانونی و کارکنان بهداشتی درمانی نیز تلاش کند. در خلال یا حین وقوع بلایای طبیعی یا در نواحی که متاثر از جنگ و کشمکش است، خانواده‌ها از خانه‌ها و جوامع خود آواره‌می‌شوند و در مناطق ناآشنا و غریب سکنا می‌گزینند. سازمان‌های اجتماعی که از کودکان و خانواده‌ها مراقبت می‌کنند، می‌توانند مادران شیرده را از طریق فراهم نمودن آنچه که آنان نیاز دارند از جمله: غذای کافی، آب، و لباس حمایت کنند. شیرمدار ممکن است تنها غذای سالم و ایمن در دسترس برای کودک تحت این شرایط باشد.

اما متأسفانه غالباً از اولین کمک‌های ارسالی به این مناطق شیر مصنوعی و بطری‌های تغذیه شیرخواران است. در موقع اضطراری استفاده ایمن از تغذیه مصنوعی دشوار بوده و ارجح است که مادران برای شیردهی حمایت شوند. کارکنان سازمان‌های بشردوستانه لازم است در زمینه حمایت اساسی از مادران شیرده و کمک و تشویق مادران به شیردهی مجدد در مادرانی که به هر علت به شیرخواران شان شیر نمی‌دهند، آموزش ببینند. آمادگی تغذیه با شیر مادر در بحران‌ها باید فراهم شود، از جمله اینکه مشاورین شیردهی در دسترس باشند و در موقعیت‌های اضطراری جهت کمک به امدادگران برای مراقبت از شیرخواران به منطقه اعزام شوند.

**از مادران شاغل حمایت کنیم تا شروع طلایی زندگی
یعنی تغذیه با شیر مادر را به کودکان خود هدیه کنند.**

■ حمایت مادران شاغل برای تعذیه با شیر مادر و پرورش

کودک

تلاش برای ترویج تعذیه با شیر مادر باید در تمامی سطوح جامعه ادامه یابد. به موازات پذیرش روزافزون شیردهی از لحاظ فرهنگی و آگاهی رو به گسترش در مورد فواید شیر مادر، در محیط کار نیز باید گرایش بیشتری نسبت به تعذیه با شیر مادر ایجاد شود. مسئولین بهداشتی و همچنین عامله مردم باید تلاش خود را برای تضمین قانونی حمایت از تعذیه با شیر مادر ادامه دهند و تعذیه با شیر مادر به عنوان یکی از حقوق اولیه به رسمیت شناخته شود. تعذیه با شیر مادر به خاطر مزایایی بی شمار برای تمامی شیرخواران بر هرگونه تعذیه جایگزین ارجح است. آکادمی طب کودکان آمریکا و نیز سازمان جهانی بهداشت بر تعذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ماه نخست زندگی و تداوم شیردهی تا زمانی که مورد تمایل مادر و شیرخوار است تاکید می‌کنند.

هر چند شیردهی در محل کار ممکن است با موانعی مواجه باشد اما مادران می‌توانند با حمایت‌های اجتماعی و قانونی و بوسیله کمک‌های علمی و عملی کارکنان بهداشتی درمانی در مراحل مختلف بارداری، تولد و شیردهی فعالیت شغلی خود را داشته باشند و با آمادگی، تعذیه مطلوب شیرخواران را مراعات کنند و به تعذیه و تربیت شیرخوار خود پردازنند.

نکته مهم آنکه کارکنان بهداشتی درمانی الگویی برای مادران هستند و بایستی برای تعذیه فرزندان خود با شیر مادر تلاش نمایند و البته بعنوان مادر در محیط کار باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند با تجربه مثبت شیردهی و با کسب علم، آگاهی و مهارت کافی کلیه مادران را برای شروع و تداوم شیردهی در شرایط مختلف از جمله ایجاد توازن بین اشتغال و شیردهی کمک کنند.

عوامل حمایت کننده از تعذیه با شیر مادر در محل کار:

ادامه شیردهی پس از بازگشت به کار اثرات مثبتی در ارتقاء اعتماد بنفس مادران و احساس توانمندی در اینفای نقش و وظایف مادری دارد. مادران چند عامل را ذکر می‌کنند که گزار از مرخصی به اشتغال را آسان تر می‌کند. این عوامل عبارتند از:

■ استفاده از مرخصی شیردهی طولانی تر

■ استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی

■ داشتن کار نیمه وقت

■ بازگشت دیرتر به کار

- انجام کارهای سبک تر
 - عدم اشتغال در شبیفت شب
 - نداشتن ساعات کار طولانی
 - مراقبت از شیرخوار توسط یک فرد مطمئن و آموزش دیده که بتواند تغذیه با شیر دوشیده شده را انجام دهد و از مصرف گول زنک و بطری اجتناب کند.
 - مراقبت از شیرخوار در محل کار
 - دوشیدن شیر در محل کار
 - کافی بودن شیر دوشیده شده
 - داشتن وقت کافی برای شیردادن یا دوشیدن پستان
 - وجود محلی تمیز و خصوصی برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر
 - حمایت از مادر شیرده در محل کار (توسط مدیریت و همکاران)
 - وجود گروه های حمایت کننده
 - برنامه کاری انعطاف پذیر
 - برنامه های آموزشی درباره تغذیه با شیر مادر برای مادر، اطراحیان، مراقبین کودک و نیز کارفرما (از جمله در مورد ضرورت تغذیه با شیر مادر، راه های افزایش و تداوم تغذیه با شیر مادر، نحوه کمک به تغذیه مجدد شیرخوار در صورت امتناع از شیرخواردن، نحوه دوشیدن و ذخیره کردن شیر مادر و مدت آن، پیشگیری از مشکلات پستان و درمان آن، مضرات استفاده از بطری و گول زنک و...)
 - حضور نمونه هایی موفق از زنان شیرده
 - حمایت خانواده
 - رژیم غذایی مناسب
 - افزایش میزان شیردهی در شب ها و اواخر هفته
- مادرانی که در تلفیق کارکردن و شیردادن موفق بودند، تغذیه بیشتر با شیر مادر در شب ها و اواخر هفته و نیز بهره مندی از حمایت همکارانی که در شیردهی توفیق داشتند را به عنوان عوامل مهم موفقیت خود ذکرمی کنند. همچنین جو مشوق و حمایت کننده محیط کار، دسترسی داشتن مادران به شیرخوارشان و یا وجود تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر را توصیه می کنند.



موانع تغذیه با شیر مادر در محل کار:

زنان شاغل مشکلات گوناگونی را در مورد تغذیه با شیر مادر در محل کار بیان می‌کنند که عبارتنداز:

- کوتاه بودن دوره مرخصی زایمان
- خستگی به علت کار زیاد
- ناسازگار بودن برخی مشاغل با تغذیه با شیر مادر (مثلاً اشتغال در خط تولید)
- احساس نگرانی درباره ناکافی بودن شیر مادر
- احساس گناه نسبت به جدا شدن از شیرخوار
- امتناع شیرخوار از گرفتن پستان
- مشکل بودن تنظیم اوقات شیردهی
- نداشتن وقت و یا ناتوانی در استفاده از شیردوش
- کمبود وقت برای دوشیدن پستان در محل کار
- فقدان یک فرد آگاه برای آموزش استفاده از شیردوش
- نداشتن فراغت و وقت آزاد
- تورم و پرخونی پستان
- تراویش شیر از پستان حین کار
- عفونت پستان
- نگرانی از بیمار شدن
- علاقه به استفاده از شیر مصنوعی
- اصرار اطرافیان به قطع شیردهی
- عادت کردن شیرخوار به تغذیه با بطربی
- مناسب نبودن محل مراقبت از کودک
- علاقه به حفظ موقعیت شغلی
- ناتوانی در ایفای وظایف مختلف
- واکنش منفی همکاران

و نیز موارد دیگری از جمله عدم امکان مراقبت از شیرخوار در محل کار، ناکافی بودن حقوق دوران مرخصی زایمان و شیردهی، عدم امکان انعطاف پذیر کردن ساعت‌ها و برنامه کار، عدم آگاهی کارفرمایان از تغذیه با شیر مادر.



نقش کارکنان بهداشتی درمانی

کارکنان بهداشتی درمانی باید با مادرانی که قصد بازگشت به کار را دارند، مشاوره نموده و ایشان را حمایت و راهنمایی کنند. همچنین برای تشکیل گروه های حامی مادران تلاش کرده، مشاورین شیردهی و انجمن های مرتبط را برای ارجاع مادران در صورت لزوم شناسایی کنند.

این راهنمایی ها مشتمل اند بر:

- ۱) دادن اطلاعات و دلگرمی درباره تغذیه با شیر مادر
 - ۲) تاکید و توصیه به مادران برای انتخاب شیر مادر جهت تغذیه شیرخوار
 - ۳) ارایه اطلاعات درباره اصول و ویژگی های تغذیه ای شیرخواران
 - ۴) توصیف راه حل های مختلف تداوم تغذیه از پستان و دوشیدن شیر پس از بازگشت به کار
 - ۵) ارایه طریق برای دوشیدن و ذخیره کردن شیرمادر و خوراندن به شیرخوار
- علاوه بر آموزش های لازم بر اساس دستورالعمل ها برای کلیه مادران، نکات کلیدی در کمک به مادران شاغل و ایجاد آمادگی قبلی در آنان، پیش بینی و حل مشکلاتی که ممکن است در زمان بازگشت به کار با آنها مواجه شوند در مراحل مختلف عبارتند از:

قبل از زایمان :

در مورد شغل و برنامه کاری مادر سوال کنید و او را در جهت موفقیت تغذیه با شیر مادر راهنمایی و تشویق کنید. از جمله:

- انتخاب روش مراقبت از کودک با توجه به اولویت ها، نیازهای کودک، هزینه و راحتی (از جمله تصمیم گیری در مورد نگهداری کودک در خانه و مراقبت از او توسط مادر بزرگ، پدر یا پرستار و یا بردن کودک به محل کار یا مهدکودک و...)
- استفاده از مرخصی زایمان و شیردهی
- اختصاص وقت چاشت و صرف ناهار به منظور دوشیدن شیر
- مذاکره با کارفرما درباره امکان اشتغال به کار پس از زایمان به طور نیمه وقت، وقت شناور یا انجام دادن کار در منزل
- بررسی شرایط و امکانات موجود و تعیین محلی برای شیر دادن یا دوشیدن شیر در محل کار
- در میان گذاشتن موضوع با زنان دیگری که تجربه شیردهی پس از بازگشت به کار را داشته اند
- بررسی راه های دوشیدن شیر، به کار بردن شیردوش مشترک، خریدن یا اجاره کردن شیردوش
- مطرح کردن برنامه ها با همسر یا مراقبت کننده بالقوه شیرخوار
- مطالعه و کسب اطلاع درباره اشتغال و شیردهی

در دوران مرخصی زایمان:

- در مراجعات دوره ای مادر و شیرخوار و هر فرست دیگری مادر را به تداوم شیردهی تشویق کنید.
- تغذیه انحصاری با شیر مادر را تا حداقل زمان ممکن (پایان عماهگی) توصیه کنید.
- ممنوعیت استفاده از گول زنک و بطاطی را به منظور تداوم و پایداری تولید شیر برای مادر شرح دهید.
- به اطرافیان مادر و مراقبت کنندگان از کودک تاکید کنید که شیر دوشیده شده مادر را با فنجان به شیرخوار بدهند.
- با هر گونه تغییری که در برنامه تغذیه شیرخواران داده می شود، دانش کارفرمایان را نسبت به آن به روز کنید.
- اطمینان حاصل کنید که نحوه مراقبت از شیرخوار مطلوب است و مراقبت کنندگان از کودک حامی تغذیه با شیر مادر هستند.
- کمک کنید تا مادر دوشیدن شیر را بیاموزد.
- به مادر توصیه کنید با کارفرمای مذاکره و سعی نماید روز بازگشت او به کار، آخرین روز کاری هفته باشد.
- بهتر است یک هفته قبل از بازگشت به کار با فرد مراقبت کننده از کودکش آشنا شده و در طول هفته کودک را برای مدت های کوتاهی به او بسپارد به طوری که اولین روز بازگشت به کار، اولین روز سپردن طفل به فرد مراقب نباشد بدین ترتیب کودک یک باره با فرد و محیطی غریب روبرو نشده و استرس مادر نیز در روزهای شروع کار کمتر خواهد بود.
- باور کنید و به مادر بگوئید که او می تواند با موفقیت به فرزندش شیر بدهد، ازسوی دیگر مادری را که نیازمند کمک بیشتر است، تشخیص داده و نیاز او را برأورده کنید.

بارگشت به کار :

- در مورد توانایی مادر برای تداوم شیردهی به وی اعتماد بنفس بدھید. به مادر توصیه کنید:
- سعی کند تنفس ها را کم کرده و با استراحت کافی از خستگی بپرهیزد.
 - پمپ شیردهی، ظرف ذخیره کردن شیر و سایر وسایل مورد نیاز را آماده استفاده نماید.
 - عکس شیرخوار یا پتو یا لباسی که بوی کودک را بدھد همراه داشته باشد. زیرا در زمان دوشیدن شیر به جاری شدن شیر کمک خواهد کرد.
 - بلافضله قبل از ترک شیرخوار او را بطور کامل شیر دهد و به محض بازگشت به خانه نیز این کار را تکرار کند.
 - به مراقبت شیرخوار تاکید کند که از تغذیه کامل وی در زمان نزدیک شدن به بازگشت مادر خودداری نماید.
 - در ابتدا برای جلوگیری از پری پستانها، هر ۳ ساعت یک بار آنها را با دوشیدن تخلیه کند.

■ مادر باید بداند که معمولاً دوشیدن شیر پس از هر وعده تغذیه کودک راحت‌تر است زیرا شیر به جریان افتاده است. با دوشیدن شیر در بعد از ظهر شیر کمتری نسبت به صبح به دست می‌آید و همچنین در اواخر هفته نسبت به روزهای اول هفته میزان شیر دوشیده شده کمتر است و این امر طبیعی است.

■ لباسی بپوشد که بتواند به آسانی دکمه هایش را باز کرده یا آن را بالا بزند.
■ شیر خوار را مکررا در طول شب و پایان هفته شیردهد و مادر و شیرخوار بیشتر با هم باشند.

■ با کارکنانی که حامی هستند و تجربه مثبت شیردهی دارند، درباره تداوم شیردهی مشورت کنند.

■ مشکلات جدی را با کارکنان بهداشتی درمانی مطلع از تغذیه با شیر مادر در میان بگذارد.

همانطور که ذکر گردید ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی باید قبل از زایمان درباره شغل و برنامه کاری مادر سوال کنند. برای تولید شیر کافی باید به مادر تاکید شود که تغذیه انحصاری با شیر خود (تا پایان ۶ ماهگی) راطی مدت مرخصی شیردهی کاملاً مراجعات کند. ارائه آموزش‌های تئوری و عملی موثر درباره دوشیدن، ذخیره کردن و آماده کردن شیر و تداوم شیردهی پس از بازگشت به کار، گذر از مرخصی زایمان و شیردهی به کار را آسان می‌کند.

در موارد بسیاری کارفرمایان و مسئولین اداری از موضوع شیردهی اطلاع ندارند. مادر باید قبل از شروع مرخصی زایمان و شیردهی و قطعاً قبل از بازگشت به کار، براساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، برنامه خود را برای شیردهی با کارفرما در میان بگذارد. هنگامی که مادر به کار باز می‌گردد، اشتغال‌وی ممکن است به صورت تمام وقت، نیمه وقت، به شکل ساعتی کاری غیر ثابت و شناور یا انجام دادن بخشی از کار در منزل باشد.

مادران ممکن است خواهان بازگشت به کار و قبول مسئولیت به صورت تدریجی باشند. در این مورد توصیه می‌شود که اگر مادری می‌خواهد به طور تمام وقت به کار باز گردد برای شروع، یک روز مانده به تعطیلات آخر هفته را انتخاب کند. باید با مسئولین و کارفرمایان برای در نظر گرفتن اوقات آزاد در حین ساعات کار به منظور شیردهی یا دوشیدن شیر مذاکره شود. مادران شیرده به منظور فراهم کردن فرصت لازم برای دوشیدن کامل پستان‌ها ممکن است به جای دو فرصت استراحت کوتاه از یک زمان استراحت طولانی تر استفاده کنند.

دوشیدن شیر در محل کار



هدف از دوشیدن شیر در محل کار حفظ حداقل سطح هورمون پرولاکتین، تخلیه کامل پستان‌ها و تولید بیشترین مقدار شیر است. رسیدن به این اهداف به مادران کمک می‌کند که پس از بازگشت به کار علیرغم دوری از شیرخوار توان بالای شیردهی را حفظ نمایند.

■ هرگاه مادر بیش از ۴ ساعت از شیرخوار دور باشد، بهتر است شیر خود را بدوشد.

■ مادرانی که پستان‌های شان را به طور منظم مقارن با اوقات تعذیه شیرخوار می‌دوشنند، احتمال اینکه به مدت طولانی تری شیردهی را آدامه دهند، بسیار بیشتر است.

■ دوشیدن شیر ضمن فراهم کردن شیر برای تعذیه شیرخوار، در پیشگیری از پرخونی پستان‌ها و احساس ناراحتی مادر بسیار موثر است. عموماً مادران شاغل مشکلات خود، پس از بازگشت به کار را به صورت مواردی از قبیل تراویش شیر از پستان، پرخونی پستان‌ها، کاهش تولید شیر... ذکر می‌کنند.

■ مادران باید قبل از بازگشت به کار دوشیدن پستان‌ها را یاد بگیرند. این اقدام با دوشیدن پستان طرف مقابل، در حالی که شیرخوار مشغول خوردن شیر از پستان دیگر است، یا با دوشیدن هر دو پستان پس از پایان یافتن تعذیه شیرخوار امکان پذیر است.

■ زمان مناسب دیگر برای دوشیدن پستان‌ها صبح زود است مشروط بر آن که مادر در هنگام صبح زودتر بیدار شود، شیرش را بدوشد و سپس شیرخوار را از پستان‌ها تعذیه نماید.

■ مادران باید در ساعات کار مناسب با دقعات شیر خوردن شیرخوار به دوشیدن پستان‌ها اقدام کنند. وقت ناهار فرصت مناسبی برای این کار است ولی مادران باید برای خوردن و آشامیدن و رفع خستگی نیز وقت کافی داشته باشند.

■ مادران برای تسهیل روند دوشیدن شیر، به یک محل تمیز و اختصاصی که بتوانند در آن احساس راحتی و امنیت کنند، نیاز دارند. یک اتاق خصوصی یا نیمه خصوصی مکان مناسبی است.

■ دوشیدن شیر باید در آرامش انجام شود بنابراین باید وقت کافی برای آن منظور گردد.

■ ماساژ ملایم پستان‌ها قبل از دوشیدن (۵-۳ دقیقه)، ماساژ ملایم نوک پستان به مدت ۲ ثانیه قبل از دوشیدن، فکر کردن به کودک، شنبیدن صدای او و یا نگاه کردن به تصویر او هنگام دوشیدن، نشستن در خلوت و سکوت و فکر کردن در محیط آرام، صرف مایعات گرم یا مایعات نشاط آور مثل آب میوه محتوی ویتامین‌ث، گذاشتن حوله گرم مرتبط روی پستان به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه جهش شیر را تسهیل می‌کند.

■ نشستن دست‌ها قبل از دوشیدن و دست زدن به شیردوش و سایر لوازم ضروری است و لازمه آن دسترسی داشتن به یک دستنشویی است.

■ مادران به یک محل مناسب برای ذخیره شیر کردن شده نیز نیاز دارند. به منظور جلوگیری از آلودگی، بایستی از نگهداری شیر در یک یخچال عمومی اجتناب شود. یک دستگاه یخچال کوچک یا ظرف محتوی بخ برای این کار مناسب است.

■ مادران باید تشویق شوند که شیرخوار خود را قبل از عزیمت به محل کار، در اولین فرست پس از بازگشت به خانه و به طور مکرر در عصرها، شب ها و روزهای آخر هفته به طور کامل شیر بدھند.

■ در محل کار مادران باید لباسی بپوشند که برای شیر دادن به شیرخوار یا دوشیدن پستان ها مناسب باشد، لباس هایی که به آسانی از جلو بازمی شوند یا به سهولت بالا زده می شوند.

■ مادران شاغل باید بدانند که هر میزان شیر خود را به شیرخوار بدھند سودمند تر است. مادران را پس از ارائه آموزش های لازم درباره راه های مختلف تغذیه با شیرمادر، صرف نظر از تصمیم نهایی آنان باید مورد حمایت قرار داد. در صورت امکان باید شیرخواران را در وقت ناهار یا استراحت مادر به محل کار وی برد. البته بهترین کار مراقبت از شیرخوار در محل کار است اما همسر، خویشاں، دوستان یا هر فرد مراقبت کننده از شیرخوار نیز ممکن است بتوانند شیرخوار را نزد مادر ببرند. همچنین مهدکودک های خصوصی در نزدیکی محل کار مادران نیز قابل استفاده است.

