



## پیام آموزشی شماره (۵)

### هیپاتیت B:

➤ ویروس هیپاتیت B در خون خشک شده در دمای اتاق بیشتر از یک هفته زنده می ماند. بنابراین انتقال هیپاتیت B ممکن است از طریق خراشیدگی ها و بریدگی ها و سایر ضایعات پوستی و مخاطی با خون و یا سایر مایعات بدن رخ دهد.

➤ ویروس هیپاتیت C حدود ۱۶ ساعت در محیط زنده می ماند.

➤ ویروس ایدز بلافاصله در محیط بیرون از بین می رود.

➤ خون حاوی بالاترین تیترو ویروس هیپاتیت B نسبت به سایر مایعات بدن می باشد.

بنابراین در صورت مواجهه شغلی (نیدل استیک، پاشیده شدن ترشحات به مخاطات و پوست غیر سالم) با فرد مبتلا به هیپاتیت B، در

صورتی که تیترو آنتی بادی فردی کمتر از ۱۰ باشد، ایمونوگلوبولین هیپاتیت B بایستی در زودترین زمان ممکن و حداکثر تا ۷ روز پس از

مواجهه تزریق شود (اما بهتر است قبل از ۴۸ ساعت تجویز شود). منبع: کتاب سبز

**دوره واکسیناسیون هیپاتیت B نیز برای فرد تماس یافته همزمان با تزریق ایمونوگلوبولین شروع می شود.**